

השאלה:

במרכזים רפואיים מבוצעות בדיקות לבירור מוקדם של היפגעות עובר במחלה זו: א) בדיקת ההורים לזיהוי קיום או היעדר הגן נושא המחלה; ב) אם שני ההורים נושאים את הגן קיים סיכוי של 1:4 שהולד יחלה במחלת טיי זקס ולכן מייעצים לזוג לא ללדת ילדים; ג) אם בכל זאת הרתה האשה – מבצעים אמניוצנטזיס (דקור מי השפיר) ואם מזהים את העובר כנושא מחלת טיי זקס – מייעצים לבצע הפלה.

האם הייעוץ הזה הוא על פי ההלכה?

תשובה:

לדעת המחבר אין מקום לייעוץ לזוג לא ללדת ילדים, כי אפשרות סטטיסטית שמיעוט ילדיהם (1:4) עלולים להיות בעלי-מום או לא-נורמליים בשכלם איננה דוחה מצות פריה ורביה. לכן אין טעם לבצע הבדיקה לגילוי מוקדם של נושאי המחלה בזוגות נושאים או באלו העומדים להינשא. כמו-כן אין טעם לבצע דקור מי השפיר, כי לדעתו אסור לבצע הפלה עקב ליקוי העובר כאשר אין סכנה לאם עצמה. ובפרט שהבדיקה הזו מבוצעת בחדשים 4-5 של ההריון, שאז גדול יותר איסור ההפלה. ומכאן שאסור לבצע את דקור מי השפיר מטעם חבלה ללא תכלית.

מסקנה:

יש לבצע את תבחין הדם בגיל מוקדם – בבתי ספר תיכוניים – אם מזהים את נושאי המחלה יש לייעץ להם שלא להשתדך עם בן/בת זוג שאף הוא נושא המחלה.

(הרב י.ג. בלייך, אור המזרח, כרך כ"א, תשל"ב, עמ' 216-218).